

# การเจ็บปวดที่ฟัน Tannáverkar



LYDHEILSUSTOD  
LSD HAD

การดูแลรักษาฟันเด็ก


Tannvernd barna



เป็นสิ่งปรกติสำหรับเด็ก ที่จะมีการเจ็บปวดที่ฟัน โดยเฉพาะเด็กที่ "เริ่มหัดเดิน" มีแผลเลือดออกภายในบริเวณเยื่อเมือกของช่องปาก แต่แผลเหล่านี้จะหายเร็ว และไม่ทิ้งร่องรอยปรากฏให้เห็น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเสมอสำหรับเด็กที่เริ่มหัดเดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฟันบนหน้า และผิวเคลือบของฟันอาจหลุดลอก หรือฟันหัก

หากมีอาการเจ็บปวดภายในช่องปาก ควรรีบไปหาทันตแพทย์ และคอยติดตามตรวจสอบหลังจากสองหรือสามชั่วโมง

Áverkar á tönnum eru algengir, einkum hjá börnum sem eru að taka sín „fyrstu skref“ út í lífið. Mikið blæðir úr sárum í munnslímhúð en græðslan er einnig hröð og oftast án ummerkja. Algengt er að los komi á tennur, sérstaklega miðframtennur efri góms, og einnig getur kvarnast upp úr glerungi eða tönn/tennur brotnað. Mikilvægt er að láta tannlækni meta áverka í munnholi og fylgjast með í nokkurn tíma á eftir.



TÆLENSKA